



Sv bact

Fiche technique

Liquide vaisselle désinfectant concentré

C'est un liquide vaisselle concentré désinfectant, parfumé au citron.

Permet le lavage, le dégraissage et la désinfection de la vaisselle à la main.

Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle. Conserve ses propriétés si les eaux sont calcaires.

Bactéricide. Levuricide. Fongicide. Virucide. Sporicide. Tuberculocide. Mycobactéricide. Bactériophage. (voir au verso pour plus de détails).

Mode d'emploi

Verser dans un bac d'eau chaude (40 à 45°C) un peu de produit : 1 à 2 g/l.

Pour une action désinfectante : se référer aux normes ci-après selon l'activité désinfectant souhaitée. Eliminer les déchets les plus importants de la vaisselle et du matériel. Laisser tremper 5 à 30 minutes puis laver et rincer à l'eau claire. Laisser sécher sans essuyer.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L, carton de 12 flacons de 1L avec bouchon push pull, ecobox de 5L.

Dimensions support ecobox (vendu séparément) : L : 24cm / H : 17,5cm / P : 25,5cm

Données techniques

- Aspect : liquide limpide jaune
- pH : 6 - 7
- Densité : 0,98 - 1,00

Précautions

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Port de gants conseillé.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2

Produit biocide TP 4

Substances actives biocides : chlorure de n-alkyl (C12-16)-n,n-diméthyl-n-benzylammonium, CAS 68424-85-1, 48.00 g/kg

Date limite d'utilisation optimale :

24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

05-09-2024

Ind. 16



(connecteur Ecobox vendu séparément.)



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



UTILISATION À 40 - 45°C utilisation en trempage eau chaude / plonge

NORMES		DILUTIONS		⌚	SOUCHEs
		collectivités - restaurants - IAA*	industrie de la viande		
BACTÉRICIDE	EN 1276	1.5%	2%	5 min	Enterococcus faecium
EN CONDITIONS DE SALETÉ		1.5%	2%	5 min	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
		1%	1.5%	5 min	Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Campylobacter Jejuni
	EN 13697	2.5%	3%	5 min	Enterococcus faecium
		2%	2.5%	5 min	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
		1.5%	2.5%	5 min	Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Campylobacter Jejuni
	EN 16615	1.5%	/	5 min	Enterococcus faecium
LEVURICIDE	EN 1650	2% 1%	2% 1.5%	5 min 15 min	Candida albicans
EN CONDITIONS DE SALETÉ					
	EN 13697	3% 2%	3% 2%	5 min 15 min	Candida albicans
	EN 16615	2%	/	5 min	Candida albicans
FONGICIDE	EN 1650	5%	/	15 min	Candida alicans, Aspergillus brasiliensis
EN CONDITIONS DE SALETÉ					
	EN 13697	5%	/	15 min	Candida alicans, Aspergillus brasiliensis
VIRUCIDE	EN 14476 SPECTRE LIMITÉ*	2%	/	5 min	Virus de la vaccine, Coronavirus humain HCoV-229E
EN CONDITIONS DE SALETÉ		4%	/	30 min	Parvovirus, Rotavirus, Virus Hepatite A
	EN 16777 SPECTRE LIMITÉ*	2%	/	5 min	Virus de la vaccine, Coronavirus humain HCoV-229E
		4%	/	30 min	Parvovirus, Rotavirus, Virus Hepatite A
SPORICIDE	EN 13704	2.5%	/	30 min	Bacillus subtilis
EN CONDITIONS DE SALETÉ		3.5%	/	30 min	Clostridium sporogenes
TUBERCULOCIDE	EN 14348	2.5%	/	30 min	Mycobacterium terrae
EN CONDITIONS DE SALETÉ		3%	/	30 min	Mycobacterium terrae
MYCOBACTÉRICIDE	EN 14348	2.5%	/	30 min	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
EN CONDITIONS DE SALETÉ		3.5%	/	30 min	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium
BACTÉRIOPHAGE	EN 13610	2%	/	30 min	Bactériophage P001, Bactériophage P008
EN CONDITIONS DE SALETÉ					

*SPECTRE LIMITÉ

autres souches couvertes par la norme

Rotavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae